

**FARMACOVIGILANCIA**

Información destinada a los profesionales de la salud

**Síndrome de Guillain-Barré (SGB) asociado al uso de gangliósidos**

Se han notificado 2 casos en España y 6 casos en Alemania con la posible asociación entre el **uso de gangliósidos**<sup>1</sup> de corteza cerebral y la aparición de **síndrome de Guillain-Barré**. Como consecuencia la comercialización de gangliósidos fue suspendida en Alemania, Grecia, Luxemburgo, España, Portugal y Brasil. Asimismo no existen pruebas disponibles de eficacia, por lo que la relación riesgo/beneficio es desfavorable.

En el mes de abril se recibió en la Red Provincial de Vigilancia Farmacéutica (RPVF) una notificación de sospecha de síndrome de Guillain-Barré (SGB) en un paciente de 65 años tratado con gangliósidos (Sinaxial®). Dicho paciente, en el mes de noviembre de 2010, recibió 5 aplicaciones, desarrollando más tarde una cuadriplejía severa con diagnóstico de SGB. El paciente fue internado y tratado por plasmaféresis. La punción lumbar y la Resonancia magnética de columna fueron normales. La asociación entre el uso de Gangliósidos y el SGB se calificó como "probable". El reporte fue cargado en la base de datos VIGIFLOW (OMS) con el ID: 2011-00953.

**Información extraída de:** Red Provincial de Vigilancia Farmacéutica (RPVF). Colegio de Farmacéuticos de la Prov. de Buenos Aires. Reporte N° 128. Junio 2011.

Productos comerciales disponibles en Argentina que contienen en su composición **gangliósidos:**

**Sinaxial® Lab.: Trb Pharma**

**Fuente:** Manual Farmacéutico. N° 614. Julio 2011.

---

<sup>1</sup> Los gangliósidos son extractos de glucolípidos de corteza cerebral de mamíferos.