COLEGIO DE FARMACÉUTICOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
1ª Circunscripción

DAP DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL	**SIM** Sistema de Información de Medicamentos

15/05/2015

FARMACOVIGILANCIA
Información destinada a los profesionales de la salud

Medicamentos utilizados para el tratamiento del trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Nuevas advertencias de uso. HC. ANMAT.

La Agencia de medicamentos de Canadá (HC, siglas en inglés) informa haber recibido notificaciones de pensamientos suicidas, intentos de suicidio y suicidios consumados en pacientes bajo tratamiento farmacológico para el TDAH. Se asociaron con el inicio del tratamiento, con la modificación de dosis e incluso con la interrupción de su administración.

Las evidencias para establecer que estos productos sean su causa son escasas, sin embargo, es posible que puedan contribuir al riesgo, ya que las personas que padecen TDAH presentan un riesgo mayor de presentar ideación suicida e intentos de suicidio.

Los prospectos de los siguientes IFAs se encuentran bajo revisión a fin de actualizar las advertencias:
- Atomoxetina
- Metilfenidato
- Guanfacina
- Dextroanfetamina
- Lisdexanfetamina

Material extraído de: Healthy Canadians (HC). ADHD drugs may increase risk of suicidal thoughts and behaviours in some people; benefits still outweigh risks.30/03/2015. Disponible en: http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/52759a-eng.php

En Argentina se comercializan productos que contienen metilfenidato y atomoxetina:

- Rubifen® (Lab. Bagó)
- Ritalina® (Lab. Novartis Argentina)
- Concerta® (Lab. Janssen Cilag)
- Methylin® (Lab. AstraZeneca)
- Recit® (Lab. Eli Lilly)
- Strattera® (Lab. Eli Lilly)

En los últimos tres años, ANMAT ha recibido 22 notificaciones de reacciones adversas por metilfenidato y 2 por atomoxetina. Ninguna de ellas correspondió a reacciones adversas psiquiátricas.

Fuente: ANMAT. Novedades Internacionales y Nacionales en Seguridad de Medicamentos. Marzo de 2015.

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas mediante **la hoja amarilla.** La misma puede solicitarla en el DAP u obtenerla de la página web del Colegio www.colfarsfe.org.ar