COLEGIO DE FARMACÉUTICOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
1ª Circunscripción

DAP **DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL** **SIM** **Sistema de Información de Medicamentos**

16/12/2011

FARMACOVIGILANCIA
Información destinada a los profesionales de la salud

Ergotamina. Interacciones graves. ANMAT

La ANMAT recuerda acerca del riesgo del uso de medicamentos que contengan el principio activo ergotamina para los pacientes que ingieren otros fármacos que inhiben su metabolización. La **contraindicación** es **absoluta** para quienes se encuentran recibiendo **terapéutica antirretroviral, especialmente** fármacos del grupo de los **Inhibidores de proteasa (ritonavir, atazanavir, amprenavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, saquinavir, tipranavir).** Ello atento a que se han reportado, durante este año, numerosos casos de ergotismo (vasoconstricción periférica y necrosis distal), algunos de los cuales requirieron la amputación del miembro afectado.
En nuestro país, hay varias **especialidades medicinales que contienen ergotamina en asociación fija con antiinflamatorios no esteroides**. Estos fármacos son indicados para cefalea y migraña. Se trata de medicamentos de condición de venta bajo receta.

Fuente: ANMAT**.** Novedades internacionales y nacionales en seguridad de medicamentos (noviembre 2011). Disponible en: http://www.anmat.gov.ar/webanmat/farmaco/Informe_noviembre_2011.pdf